

KOYUNCULUK

Koyun et, st, yapađı, deri ve gbreleri ile insanlara ekonomik gc veren önemli bir hayvandır.

Hem çiftçi hem de lke ekonomisini kaldırmak için koyunculunun yaygınlaştırılması gereklidir. Ama bakım ve beslenme koşullarının iyileştirilmesi, öte yandan koyunların saf yetiştirme ve melezleme yolu ile ıslah edilerek verimliliğın artırılması şarttır.

Öyleyse koyunculunun doğal ve ekonomik koşulların gerektirdiđi yönde gelişebilmesi için, mevcut yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesi ve yetiştiricilerin yenilikleri bilmesi ve uygulaması gerekir.

Koyunculuk yapmaya karar verdiđimiz takdirde öncelikle yaşadıđımız bölgeyi iyi tanımamız ve ona göre uygun ırkla çalışma yapmalıyız.

Genel olarak Anadolu'nun iç kısımlarında yağlı kuyruklular, denize yakın bölgelerde ince kuyruklular yaygındır.

Yağlı kuyruklu koyunlar Morkaraman, Akkaraman, Dađlıç ve İvesidir. İnce kuyruklu koyun ırklarımız ise Kıvrıkcık, Sakız, Karayaka ve Merinostur.

MORKARAMAN

Genel olarak Dođu İllerimizde yetiştirilir. Vcut renkleri kıızıdan mora kadar deđişmekte baş, burun, karın altı ve bacaklar çıplaktır. Yađlı kuyrukludur.

Anaçlarda canlı ađırlık 50-60 kg, st verimi 50-60 Litre kirli yapađı verimi 2-2,5 kg. olup her 100 koyundan 95-105 kuzu alınmaktadır.

St kesiminden sonra 3 aylık besleme ile 20-25 kg. karkas alınabilir.

AKKARAMAN KOYUNU

Batıda Eskişehir ve Ktahya'dan başlayarak Dođuda Sivas'a kadar, sahil bölgeleri dışında Orta Anadolu'da ve geçit bölgelerinde yetiştir.

Bunlarda vcut beyaz renkli yapađı ile örtldr. Ađız, burun, göz çevresi, kulak ve ayaklarda siyah lekeler rastlanır. Yađlı kuyrukludur.

Anaç koyunlarda canlı ađırlık 40-45 kg. st verimi 50-60 Litre kirli yapađı verimi 1,5-2 kg.dır. 100 koyundan 100-110 kuzu alınır.

St kesiminden sonra 3 aylık besleme ile 20-22 kg. karkas verebilir.

DAĐLIÇ KUYUNU

Sakarya nehrinden başlayıp Ege Bölgesinin kıyı İllerine kadar uzanır.

Vcut beyaz renkli, kaba karışık yapađı ile örtldr. Ađız, burun, göz etrafları ve ayaklarda siyah lekeler görülr. Erkekler helezoni boynuzlu, dişiler boynuzsuzdur. Kuyruk yağlı olup kalp şeklindedir.

Anaç koyunlarda canlı ađırlık 35-40 kg., st verimi 40-50 Litre, kirli yapađı verimi 2-2,5 kg.dır. 100 koyundan 90-100 kuzu alınır.

SAKIZ KOYUNU

İzmir İlinde özellikle Çeşme İlçesinde yetiştir. Vcut beyaz renkli, kaba-karışık yapađı ile örtldr. Baş ve bacaklarda siyah lekeler vardır. Erkeklerde kuvvetli, kıvrımlı boynuz bulunur. Dişiler boynuzsuzdur. Uzun yađsız kuyrukludurlar.

Anaç koyunlarda canlı ađırlık 40-45 kg., st verimi 120-180 Litre dir. 100 koyundan 180-200 kuzu alınır. Bu yöre dışına çıkarıldıđında bu verim alınamamıştır.

KIVIRCİK KOYUN

Trakya ve Marmara'nın Güneydoğusundaki İllerde Ege Bölgesinin Manisa, İzmir, Aydın İllerinde yetişir.

Vücut beyaz renklidir. Erkeklerde beyaz renkli kıvrımlı boynuz olup, dişiler boynuzsuzdur. İnce uzun kuyruğu vardır.

Anaç koyunlarda canlı ağırlık 40-42 kg., süt verimi 60-90 Litre, kirli yapağı verimi 1,5 kg. dir. 100 koyundan 110-130 kuzu alınmaktadır. Et kaliteli olup, süt kesiminden sonra iki aylık besleme ile 17-18 kg. karkas verebilir.

KARAYAKA KOYUNU

Karadeniz kıyı şeridinde özellikle Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Tokat İllerinde yetiştirilir.

Vücut beyaz renkli kaba yapağı ile örtülüdür. Erkeklerde kalın kıvrımlı boynuzlar olup, dişilerde boynuz yoktur. Kuyruk yağsız ince ve uzundur.

Anaç koyunlarda canlı ağırlık 35-40 kg., süt verimi 40-45 Litre olup, kirli yapağı verimi 1,5-2 kg.dir.

İVESİ KOYUNU

Suriye sınır boyunda Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay İllerinde yetişir.

Baş ve bacaklar kahverengi vücudu ise beyazdır. Yağlı kuyruklu koyunlardır. Erkekler boynuzlu, dişiler boynuzsuzdur.

Anaç koyunlarda canlı ağırlık 44-48 kg. süt verimi 90-155 Litre, kirli yapağı verimi 2-3 kg.dir.

KARACABEY MERİNSU

Balikesir, Bursa yörelerinde yetiştirilir. Anaç koyunlarda canlı ağırlık 55-70 kg., süt verimi 50-55 Litre, kirli yapağı verimi 3,5-4 kg.dir.

100 koyundan 125-130 kuzu elde edilir. Vücut beyaz renkli kuyruk ince uzundur. Erkeklerin çok azında boynuz görülür, dişiler boynuzsuzdur.

KONYA MERİNSU

Vücut beyaz renkli yapağı ile örtülüdür. Erkek ve dişiler boynuzsuzdur. Kuyruk yağsız ince ve uzundur.

Anaç koyunlarda canlı ağırlık 54-56 kg., süt verimi 40-50 Litre, kirli yapağı verimi 3,6-3,8 kg. olup, 100 koyundan 130-140 kuzu alınır.

MALYA KOYUNU

Vücut beyazdır. Baş ve bacaklarda siyah lekeler bulunabilir.

Yarım yağlı kuyruklu koyunlardır. Ancak koyunlarda canlı ağırlık 45-50 kg.dir, kirli yapağı verimi 2,4-2,8 kg.dir.

GÖKÇEADA KOYUNU

Gökçeada ve Çanakkale çevresinde yetişir. Beyaz yapağılı ince uzun kuyruklu, küçük cüsseli bir ırktır. Erkekler boynuzlu, dişiler boynuzsuzdur.

Anaç koyunlarda canlı ağırlık 35-40 kg.dir, süt verimi 50-60 Litre, kirli yapağı verimi 2-2,5 kg.dir.

TUJ KOYUNU

Türkiye'nin Kuzeydoğu İleri Kars, Ardahan ve Iğdır bölgelerinde yetiştirilir.

Ana koyunlarda canlı ağırlık 38-42 kg., st verimi 55 Litre, kolarda yapağı verimi 3-5 kg.dır.

HERİK KOYUNU

Sivas, Amasya, Sinop, Samsun, Trabzon ve orum İllerinde daėlık blgelerde yetişir.

Kk csseli erkekler boynuzlu, kuyruk yaėlıdır.

HEMŐİN KOYUNU

Karadeniz sahillerinde Artvin dolaylarında yetişir. Kahverengi olmalarına karŐın siyahları da vardır. Et ve yapağı kalitesi dŐktr.

TAHİROVA KOYUNU

Ege ve Marmara Blgesinde yetişir. Melezdir. Yavru ve st verimi yksektir.

ÖDEMİŐ KOYUNU

Batı Anadolu'da Ödemiş evresinde yetişir.

DAMIZLIK SEİMİ

Blgemize gre yetiŐtiriciliėini yapacaėımız koyun ırkını setikten sonra iyi bir damızlıkla iŐe baŐlamak baŐarıyı arttıran en nemli Őartlardan biridir.

Seilen damızlık;

- Vcudu dzgn ve kusursuz
- Kendi ırkının zelliklerini taŐıyan
- Yksek verimli, hastalısız, dl verimi yksek ve uzun mrl olmalıdır.

Damızlık olacak eti koyunda mmkn olduėu kadar byk, derin geniŐ ve dolgun bir vcut yapısı gzlenmelidir. BaŐ kısa ve geniŐ, boyun kısa ve kalın olmalıdır. Gėsn geniŐ derin ve kaburgaların mmkn olduėu kadar dıŐa dnk olması istenir. Bol et veren sırt, bel ve saėrının dz bir hat oluŐturması ve olabildiėince geniŐ olması istenen eti zelliklerdendir.

Damızlık st koyunlarda kemikler ince boyun uzun vcut yksek ve uzundur. Saėrı uzun ve arka bacakları arası byke memeye yer verecek Őekilde olmalıdır.

Karın nisbeten geliŐmiŐ memeler yeter byklkte ve bezel meme zelliėindedir. BaŐ kuru, asil ve zarif yapıda olmalıdır. Kulaklar byk ve nisbeten sarkıktır. St verimi ile tanınmıŐ ırklar boynuzsuz veya zarif boynuzludur.

Koun yumurtaları ne kadar bykse dllenme kabiliyeti o kadar iyidir.

SRDEN AYRILMASI GEREKEN KOYUNLAR

- DiŐleri ve tırnakları bozuk olanlar
- ok yaŐlı, ok zayıf koyunlarla kavruk kalmıŐ koyunlar
- Kısır koyunlar, ok az st verenler
- Yapaėı kısa, seyrek ve dklyorsa
- zellikle Merinos ve kıvrıklarda lekeler varsa

- Yapağı körü varsa

Bu tip koyunlar sürüden atılırlar.

DAMIZLIK KOÇ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Kuvvetli ve sağlıklı olmalı
- İrkin bütün özelliklerini göstermeli
- Canlı parlak bakışlı ve hareketli olmalıdır
- Yumurtalıklar torbaya inmiş olmalıdır
- Yapağısı kendi ırkının özelliklerini taşımalı
- Bacaklar kısa ve düzgün olmalıdır
- Sağrısına basıldığında çömelmelidir

Ergin bir koç iyi beslendiğinde ortalama 35-40 koyuna aşabilmektedir.

KOYUNLARDA ÜREME VE DÖL VERİMİ

Koyunculukta başarılı olmak, düzenli ve çok miktarda yavru olmaya bağlıdır. Elde edilen yavru sayısı ne kadar çok olursa sürüde iyileşme o kadar hızlı olur. Bu da hayvanın ırkına ve beslenmeye bağlıdır.

KOÇA VERME

Dişi tokluyu koça vermekte 18 ayı geçmemeliyiz. Sürüdeki koyunlar pratikte 6-8 yaşlarına kadar, koçlar ise 4-5 yaşlarına kadar damızlık olarak kullanılabilirler.

KIZGINLIK (KOÇA GELME)

Koyunlarda kızgınlık genelde mevsime bağlıdır. Kızgınlık 28-30 saat devam etmektedir. Kızgınlık 14-19 günde bir tekrarlanır. Şayet sürüde koç katımı serbest olarak yapılıyorsa koç sürüde en az 35 gün kalmasında fayda vardır. Koç katımında önemli faktör dişilerin kızgınlığa gelmesidir. 20-30 koyuna 1 koç düşünülür.

KIZGINLIK BELİRTİLERİ

Koyunlar meleyerek erkek koyunun yanına sokularak veya birbiri üzerine atlayarak kızgınlığı belli ederler.

Bu dönemde ferç şişmiştir, çora akıntısı gelir ve sık sık idrar yapar.

KOYUNLARDA SAĞIM

Bir koyunda elde edilen gelirin %45'i etten, %15'i yapağı ve yapağıdan, %40'da süttendir. Bu yüzden sağım ve süt üretiminde çok önemli yer tutar.

Sağımında dikkat edilecek konular;

- Meradan dönen hayvan hemen sağıma alınmaz. Bir saat kadar dinlendirilir.
- Sağımında hayvanlara sert muamele yapılmaz
- Günde iki sağım yapıldığında sabah ve akşam sağımları arası en az 10 saat olmalı
- Soğuk ve kırılgan günlerde sabah sağımı daha geç sıcak günlerde daha erken yapılır

- Uzak meradaki hayvanlar olduđu yerde sađılır
- Sađım seri ve kısa sürede yapılmalıdır. 2-2,5 saatte 100 koyun sađılabilir
- Sađımdan önce memeler ve kaplar mutlaka temizlenir.

KOYUNLARDA BESLENME

Koyunlarda beslenmeyi dört bölümde inceleyebiliriz.

- 1- Koç katımında beslenme
- 2- Gebelikte beslenme
- 3- Süt veriminde beslenme
- 4- Verimsiz dönemde beslenme

1- Koç Katımında Beslenme :

Koç katımından 2 hafta önce başlayarak 6 hafta günde 400 gr.dan başlayarak 700-800 gr.a kadar fabrika yemi veya arpa, yulaf karışımı ile ek yemleme yapılır.

2- Gebelikte Besleme :

Gebelikte ilk üç ay mera iyi ise ek yeme gerek yoktur. Son 45 günde 300 gramdan başlanarak doğuma kadar 800 grama çıkılarak ek yemleme yapılır.

3- Süt Döneminde Besleme :

Tek kuzulu koyunlara günlük 700 gr. dane yem karması, ikiz kuzulu koyunlara da 1 kg. dane yem karması verilir.

Verimsiz dönemde mera ve anız otlatması kafi gelmektedir.

DAMIZLIK KOÇ BAKIMI

- Günde 1 kg. kadar yulaf
- Her gün biraz yeşillik
- Yeteri kadar hareket
- Kırkım yapılması
- Sabahları yemden önce bir tane taze yumurta yedirmeliyiz.

Bunlar yapılırsa koçların aşım kabiliyetleri yükselir, beklenen verim elde edilir.

KUZU BÜYÜTÜRKEN ŞU HUSUSLARA DİKKAT EDELİM

- Kuzu bölmelerinin altı temiz ve kuru olmalı, hava cereyanı olmamalıdır
- Kuzu bölmelerinde kuzular sıkışık olmamalıdır
- Kuzunun anasını emip emmediği izlenmelidir
- Kuzulara 15 günden sonra kuru ot ve kuzu başlangıç yemi verelim

- Kuzular meraya çıkmaya başlayınca otlama öncesi bir miktar kuru ot verelim ve mutlaka enterotoksemi aşısını yaptırın.

YOĞUN KUZU BESİSİ (ENTANSİF)

Önce kuzu büyütme yemine azar azar besi yemi katılır. Sonra her iki yem ayrı ayrı yemliklere konur. Bir hafta geçtikten sonra büyütme yemi kesilir.

Besiye alınan kuzular süttten kesilirler. Erkek kuzuların besi kabiliyeti daha yüksektir. O yüzden erkek kuzularla çalışmak daha karlıdır.

SÜT KUZUSU BESİSİ

Kuzu hem anasını emer hem de bolca kesif yem yer. Kuzulara 2 haftalık olduktan sonra ana sütüne ilaveten yiyebildikleri kadar kesif yem vermeliyiz.

KOYUN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK KONULAR

- 1- Dönemler itibariyle yapacağımız yem değişikliğine yavaş yavaş geçilmelidir.
- 2- Mera dönemi başlangıcında meraya çıkış saatleri yavaş yavaş artırılarak devam edilmelidir.
- 3- Aşırı çiğ ve kırıntının olduğu dönemlerde meraya çıkmadan önce bir miktar kuru ot veya saman verilip ondan sonra çıkarılmalıdır.
- 4- Verilen yem ne olursa olsun küflü ve kokuşmuş olmamasına özen gösterilmelidir.
- 5- Doğumun hemen akabinde anaya soğuk su verilmemelidir.

AĞIL YERİ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK KONULAR

- 1- Taban suyu yüksek olmamalı
- 2- Meraya yakın olmalı
- 3- Meyilli arazi üzerinde olmalı
- 4- Yerleşim biriminden uzak olmalı
- 5- Kuzey rüzgarlarına kapalı olmalı

AĞIL YAPIMINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

- 1- Bölgenin iklimine uygun olmalı
- 2- Hakim rüzgarlardan ve soğuktan korunmuş olmalı
- 3- İşlerin kolay görülmesine uygun olmalı
- 4- Hayvan sayısına yeterli olmalı
- 5- Maliyeti düşük olmalı

AĞIL ALAN HESABI

Gebe ve emziren koyun için : 2,25-2,5 m²

Erkek veya dişi toklu için : 0,5-0,6 m²

Koç için : 1,2-1,5 m²

Koyun için : 0,8- 1 m²

Süt emen kuzu için : 0,3-0,4 m²

Gezinti avlusu, ağılın kapladığı alanın iki katı olmalı, etrafı 1 m. yükseklikte çevrilmelidir.

Koyunların altında üstü de kuru olmalıdır.